

Les deux premières consultations lors d'usage de cocaïne

1^{ère} Consultation (environ 30 minutes)

Anamnèse

Voie de consommation

- iv ; sniff ; fumée
- type de consommation : mono consommation (avec ou après alcool) ou polyconsommation (avec ou après méthadone/héroïne)

Fréquence de la consommation

- Fin de semaine (sorties)
- Plusieurs jours par semaine
- Plusieurs fois par jour

Effet de la cocaïne

- Stimulateur d'activités
- Facilitateur des contacts
- Calmant (penser au TDAH)

Situation sociale

- Travail, loisirs, relations, finances (dépenses pour la consommation, dettes)

Situation psychique

- Dépression, peurs, angoisses
- Psychose
- TDAH, troubles du sommeil
- Troubles alimentaires, autres comportements addictifs
- Suicidalité

Status somatique

- Status général, veiller particulièrement à :
 - Poids/BMI
 - Lésion de la cloison nasale (sniff)
 - COPD (fumeurs)
 - Auscultation cardiaque (endocardite)

Examens complémentaires :

- FSC, glucose, créatinine, ASAT/ALAT, GGT, sérologies hépatites et VIH
- ECG

2^{ème} Consultation dès que possible (environ 30 minutes)

- Revue de la 1^{ère} consultation : entretien, résultats, status quo
- Définir de manière générale les objectifs du traitement
- S'interroger sur la prescription de médicaments
- Travail en collaboration ou référence à un centre spécialisé, psychiatre ou psychologue, groupes de parole ou de soutien