

## **Types de patients consommateurs de cocaïne**

Dans l'ensemble, on distingue deux groupes de patients :

### **Consommateurs de cocaïne seule**

Quoique également nommés mono-consommateurs, l'alcool est souvent associé (fonction initiatrice « trigger »). En général socialement intégrés, leurs besoins et leur situation sociale diffèrent de ceux des personnes dépendantes aux opioïdes. Un accompagnement et un traitement différenciés sont donc nécessaires. Ils réagissent mieux aux formes de prise en charge hautement structurées (cadres spécifiques, médicaments, inclusion d'un proche dans le suivi, suivi médical et psychiatrique, intervention orientée sur une approche éducative).

Ces approches doivent pourtant s'adapter à chaque individu, afin d'atteindre des taux de rétention élevés et d'éviter les ruptures de traitement prématurées.

### **Poly-consommateurs**

Il s'agit de personnes qui consomment en général également de l'héroïne ou de la méthadone. Elles sont le plus souvent marginalisées voire socialement non intégrées. L'héroïne reste fréquemment la principale problématique, avec une dépendance primaire aux opioïdes.

Dans un programme de substitution aux opioïdes, la consommation de cocaïne est souvent un facteur perturbateur.

Il s'agit de différencier les deux types de consommateurs et de planifier un suivi adéquat au moyen d'un traitement et d'une thérapie adaptés. Un travail en collaboration avec un centre spécialisé est souvent nécessaire.