

Problèmes somatiques liés à l'usage de cocaïne

L'injection de cocaïne est la voie de consommation la plus dangereuse, suivie de la fumée. Les deux permettent un afflux rapide du produit vers les organes.

Problèmes cardiaques

Des spasmes artériels peuvent provoquer un infarctus, des accidents vasculaires cérébraux et des occlusions artérielles périphériques. La cocaïne favorise aussi l'agrégation thrombocytaire et l'artériosclérose. Des troubles du rythme et un arrêt cardiaque peuvent survenir lors d'afflux rapides de cocaïne.

Problèmes cutanés

La cocaïne provoque un prurit. Les points d'injections sont souvent grattés avec une inflammation des tissus et suppuration (« cafards de cocaïne » et « vers ») en raison d'un délire d'épizoonose. Par la suite, un impetigo ou une septicémie (endocardite) sont possibles.

ORL

Perforation de la cloison nasale en cas de sniff chronique.

Infections

Infections VIH et hépatites en cas de pratiques à risque ou de rapports sexuels non protégés. La transmission des virus des hépatites peut survenir lors du partage de pailles.

Troubles neurologiques

La survenue de crises d'épilepsie suite à l'usage de cocaïne seulement est controversée.

En cas de consommation d'une dose excessive de cocaïne : arrêts respiratoires paradoxaux, coma, mort.

Des troubles cognitifs sont possibles lors de consommation prolongée.

Grossesse

Trouble du développement chez l'embryon et le fœtus, infarctus du placenta, carences et accouchement prématuré

Symptômes de manque post-partum, morbidité et mortalité infantiles augmentées.